

İŞYERİ İÇİN OLASI COVID-19 VAKA İLE TEMASLI VE YAKIN TEMASLI ÇALIŞANLARIN TESPİTİ VE İZLEMİ

Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından önceki 2 gün (48 saat), asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48 saat) içinde temaslı olan kişiler değerlendirmeye alınır.

TEMASLI (Düşük Riskli) KRİTERLERİ:

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri alarak (ağız ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takarak) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda düşük riskli temaslı olarak kabul edilir.

- » COVID-19 hastasıyla iyi havalandırılan aynı kapalı ortamda bulunmuş kişiler
- » COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler
- » COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar
- » COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar

COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (maske hiç takılmamış veya uygun takılmamış) önlemleri almadan;

- » COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 2 metreden uzak 10 dakikadan kısa süre bulunmuş maskesiz kişiler

(Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması, 02 Ekim 2021)

YAKIN TEMASLI (Yüksek Riskli) KRİTERLERİ:

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir.

- » COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede tek seferde 10 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan, konuşan kişiler
- » COVID-19 hastasına doğrudan bakım sağlayan kişiler
- » COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler
- » COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (Örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılma vb.)
- » COVID-19 hastasının salgılarıyla (tükürük, balgam vb.) veya COVID-19 hastasının hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler
- » COVID-19 hastasıyla iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli olarak değerlendirilen kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan kişiler (maskeli olsalar bile)
- » COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler maske kullanımına bakılmaksızın
- » COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler
- » COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışan kişiler
- » COVID-19 hastasıyla yurttan veya otelde aynı odayı paylaşan kişiler maske kullanımına bakılmaksızın

COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (uygun maske kullanımı var) önlemleri alınmış durumda;

- » COVID-19 hastasıyla aynı şehirler arası otobüste, tren kompartımanında seyahat eden kişiler

(Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması, 02 Ekim 2021)

OLASI COVID-19 ENFEKSİYONU OLAN BİR ÇALIŞAN TESPİT EDİLDİĞİNDE;

•İletişim bilgileri
•Semptom ve bulguları
•Servis kullanıyorsa serviste ve işyerinde temas ettiği kişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup olmadığı) belirlenerek kayıt altına alınır. Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından önceki 2 gün (48 saat), asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48 saat) içinde temaslı olan kişiler değerlendirmeye alınır.

Dezenfeksiyon ve temizlik işlemi yapılacak yerler:
•Çalışma alanı
•Servis aracı
•Ortak kullanım alanları (yemekhane, tuvalet, lavabo, soyunma odası vs.)
•Ortak kullanılmak zorunda kalınan ekipmanlar
•Dolaplar

COVID-19 Semptomları
•Ateş
•Öksürük
•Nefes darlığı
•Baş ağrısı
•Boğaz ağrısı
•Burun akıntısı
•Kas ve eklem ağrısı
•Aşırı Halsizlik
•Yeni ortaya çıkan tat ve koku alma duyusu kaybı
•İshal vb.

ALO 184 aranır, sağlık yetkililerinin yönlendirmelerine uyarak çalışan ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilir. İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü bilgilendirilir. İşverene, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine derhal bilgi verilir.

YAKIN TEMASLI İZLEMİ

TEMASLI İZLEMİ

•Çalışana durumu hakkında bilgi verilir.
•Temaslı takibi İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilir ve yürütülür.
•Sağlık Bakanlığı prosedürleri hakkında çalışana bilgi verilir.
•İşyeri hekimi, olası COVID-19 enfeksiyonu olan çalışanın tetkik ve tanı sonucu hakkında bilgi sahibi olana kadar, yakın temaslı olan çalışanın mümkünse evden çalışması sağlanır.

•Çalışana durumu hakkında bilgi verilir.
•İşyeri hekimi, olası COVID-19 enfeksiyonu olan çalışanın tetkik ve tanı sonucu hakkında bilgi sahibi olana kadar, mevcut korunma yöntemleri ile temaslı çalışan işyerinde izlenir.

Sonuç: COVID-19 KESİN VAKA

Sonuç: DİĞER HASTALIKLAR

Sonuç: COVID-19 KESİN VAKA

Sonuç: DİĞER HASTALIKLAR

Yakın temaslı çalışanlar İl/ilçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. Yakın temaslı çalışanların, hasta çalışan ile son temas ettikleri tarihten itibaren evde veya izole olduğu yerde izlemi Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanır.

Yakın temaslı çalışanın izlemi sonlandırılır. Temaslı-yakın temaslı kişilerde mevcut koruma yöntemlerine ek başka önlem alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları hatırlatılır.

Temaslı çalışanın, işyerinde mevcut korunma yöntemleri ile son temas tarihinden itibaren 14 gün boyunca izlemine devam edilir.

Temaslı çalışanın işyerinde izlemi sonlandırılır. Temaslı-yakın temaslı kişilerde mevcut koruma yöntemlerine ek başka önlem alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları hatırlatılır.

Yakın temaslılarda takip süreleri içerisinde COVID-19 semptomları gelişirse fiyasyon ekiplerince numune alınması sağlanır, yakın temaslı kişiler semptomları nedeniyle hastaneye başvurmak isterlerse tıbbi maske takarak sağlık kurumuna başvurması sağlanır.

Yakın temaslılarda karantinanın sonlandırılması
• Aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış kişilerin COVID 19 yakın temaslı olması halinde karantina süresi genel olarak 14 gün önerilmektedir. Bununla birlikte semptom takibi yapılarak herhangi bir semptom gelişmediğinde 10. günde de, kalan günlerde maske ve mesafeye dikkat etmek suretiyle PCR yapılmaksızın karantina sonlandırılabilir. Karantinanın 10. günde sonlandırılma uygulaması yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda uygulanmaz.
• Aşılama sonrası; Önerilen aşı şemasını tamamlamış veya son altı ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerin COVID-19 pozitif kişi ile yakın teması (yüksek riskli) [COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişilerin rehberde belirtilen durumları] olması durumunda bu kişiler, koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler.

Bu kişiler;
» Semptomlar açısından kendisini takip eder. Klinik belirti gelişmesi durumunda; semptom/semptomların geliştiği gün, sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır.
» Semptom gelişmemesi durumunda; temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır.
» Temasın 5. günü PCR testi yaptırmaması durumunda ise 6. gün HES kodları riskli hale gelir ve kişi karantinaya alınır.
Bu kişiler, PCR pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilir ve rehberine uygun olarak izolasyon koşullarında takip edilir.
» PCR testleri negatif çıkarsa; kişiler izolasyona alınmaz, HES kodları riskli duruma gelmez, bu kişilerin sistemdeki kaydı 6. gün sonlandırılır. Ancak bu kişiler, kendilerini 14 gün boyunca semptomlar açısından takip eder ve 14. günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler gibi COVID-19 açısından riskli gruplara bakım vermemelidir.

Varyant Suşlar ile ilgili olarak; Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için endişe verici varyantlar ile enfekte hastaların mümkün olduğunca tek olarak odalarda yatırılması önerilir. DSÖ tarafından endişe verici varyant olarak tanımlanan Hindistan, Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici varyant olarak tanımlanmış olan varyantların saptanması durumunda izolasyon süresi 14 gündür; 14. günün bitiminde test yapılmaksızın izolasyon sonlandırılır ve izolasyonu erken sonlandırmak amacı ile bu kişilere PCR testi yapılmaz.

Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 02 Ekim 2021



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ